



Somministrazione dei Farmaci per Via Orale

Materiale	<ul style="list-style-type: none">-Carrello dei farmaci-Prescrizioni e scheda per registrazione delle somministrazioni farmacologiche (o scheda elettronica di somministrazione dei farmaci)-Acqua minerale naturale-Bicchieri e cucchiai-Frantumatori di pillole (se necessario)-Sfigmomanometro e fonendoscopio (se necessario)
Procedura	Motivazioni
Controllare l'accuratezza e la completezza della scheda di prescrizione del farmaco (nome del paziente, nome e dosaggio del farmaco, via di somministrazione ed orario di somministrazione)	Controllo di sicurezza: Regola delle 10 G Rilevare se presenti allergie riferite Controllo terapia giorno precedente
Identificare attivamente il paziente e confrontarlo con la prescrizione.	Permette di identificare il giusto paziente
Presentarsi, spiegare la procedura e chiedere il consenso	Aumenta la compliance del paziente
Eseguire il lavaggio antisettico delle mani – frizione alcoolica	Diminuisce il trasferimento dei microrganismi
Valutare la capacità di deglutizione, lo stato di coscienza, il grado di mobilità della persona, la posizione del paziente	Personalizzare la procedura e individuare possibili rischi
Se si usa un carrello per i farmaci portarlo nella stanza del paziente	L'organizzazione dei materiali consente di risparmiare tempo ed evita la possibilità di errore
Aprire il cassetto o il carrello dei farmaci, selezionare il farmaco corretto dalle scorte o dal cassetto del carrello. Confrontare l'etichetta del farmaco con la prescrizione	I farmaci sono sicuri quando sono chiusi in un armadio o in un carrello
Controllare l'accuratezza e la completezza della scheda di prescrizione del farmaco (nome del paziente, nome e dosaggio del farmaco, via di somministrazione ed orario di somministrazione (PRIMO CONTROLLO), controllare la data di scadenza sulla confezione.	Leggere le etichette (nome del farmaco e del principio attivo) e confrontarle con la prescrizione: riduce gli errori
Preparare il farmaco predisponendo la dose di farmaco prescritta calcolando il dosaggio in relazione alla formulazione disponibile (evitare di toccare i farmaci con le mani), disponendola nel contenitore (BICCHIERINO) del paziente.	Consente di evitare errori di preparazione

Preparare il farmaco predisponendo la dose di farmaco prescritta calcolando il dosaggio in relazione alla formulazione disponibile (evitare di toccare i farmaci con le mani), disponendola nel contenitore (BICCHIERINO) del paziente.	
Controllare farmaco/prescrizione prima di somministrarlo al paziente (SECONDO CONTROLLO)	
Non frammentare pillole ad azione prolungata	La frammentazione potrebbe produrre una dose inadeguata ed eliminare l'azione prolungata necessaria lungo l'intera giornata
Non aprire le capsule sigillate	Per non alterarne l'efficacia
Non frammentare il contenuto di capsule contenenti palline o granuli	Queste sono destinate ad un'azione a rilascio prolungato
Non somministrare per via orale delle formulazioni sublinguali	
Non somministrare farmaci orali per via sublinguale	
Le compresse che presentano “tacche” possono essere divise	Evita lo sbriciolamento Se una compressa non presenta tacche, è possibile dividerla, a meno che non sia: a rilascio prolungato, costituita da una miscela di farmaci , rivestita
Assicurarsi dell'avvenuta assunzione del farmaco	
Smaltimento dei dispositivi utilizzati secondo procedura	
Riordino del materiale	
Registrare l'avvenuta somministrazione e segnalare eventuali note	

Somministrare Farmaci per via orale in forma liquida	
Controllare l'accuratezza e la completezza della scheda di prescrizione del farmaco (nome del paziente, nome e dosaggio del farmaco, via di somministrazione ed orario di somministrazione)	Controllo di sicurezza: Regola delle 10 G Rilevare se presenti allergie riferite Controllo terapia giorno precedente
Presentarsi, spiegare la procedura e chiedere il consenso	Aumenta la compliance del paziente
Identificare attivamente il paziente e verificare confrontarlo con la prescrizione.	Permette di identificare il giusto paziente
Eseguire il lavaggio antisettico delle mani – frizione alcoolica	Diminuisce il trasferimento dei microrganismi
Valutare la capacità di deglutizione, lo stato di coscienza, il grado di mobilità della persona, la posizione del paziente	
Aprire il cassetto o il carrello dei farmaci, selezionare il farmaco corretto dalle scorte o dal cassetto del carrello. Confrontare l'etichetta del farmaco con la prescrizione	
Controllare l'accuratezza e la completezza della scheda di prescrizione del farmaco (nome del paziente, nome e dosaggio del farmaco, via di somministrazione ed orario di somministrazione (PRIMO CONTROLLO), controllare la data di scadenza sulla confezione.	Leggere le etichette (nome del farmaco e del principio attivo) e confrontarle con la prescrizione: riduce gli errori
Rimuovere il tappo dalla bottiglia, appoggiarlo su un piano mantenendo la parte aperta verso l'alto. Porre il bicchiere su una superficie stabile	
Versare il farmaco liquido facendo attenzione al corretto dosaggio (conta delle tacche del misurino dello sciroppo) evitando il contatto con il bicchiere. Mantenere il contatto visivo tra flacone e bicchiere	
Pulire i bordi della bottiglia con garza prima di riposizionare il tappo	
Controllare farmaco/prescrizione prima di somministrarlo al paziente (SECONDO CONTROLLO)	
Chiedere la collaborazione della persona nell'assumere tutta la dose di farmaco prescritto. Assicurarsi dell'avvenuta assunzione del farmaco	
Controllare farmaco/prescrizione dopo l'avvenuta somministrazione, riponendo la confezione del farmaco nello scaffale (TERZO CONTROLLO)	
Smaltire i dispositivi utilizzati secondo procedura	
Riordinare il materiale	
Riposizionare la persona	
Igiene delle mani	
Registrare l'avvenuta somministrazione e segnalare eventuali note	