



Procedura

RACCOLTA DI UN CAMPIONE FECI¹

Personale	<ul style="list-style-type: none"> • 1 operatore
Materiale	<ul style="list-style-type: none"> • guanti monouso • apposito contenitore monouso con spatola incorporata o contenitore specifico per sangue occulto • etichetta e richiesta debitamente compilata

PROCEDURA

<i>CAMPIONE PER ESAME CHIMICO-FISICO-BATTERIOLOGICO-PARASSITOLOGICO</i>	
<i>Azioni</i>	<i>Motivazioni</i>
Verificare la prescrizione e provvedere alla richiesta dell'esame al laboratorio	
effettuare il lavaggio sociale delle mani	Precauzione standard per ridurre il rischio di trasmissione delle infezioni
identificare l'utente e verificare la corrispondenza del nome contrassegnato sulle provette	Per evitare errori sull'utente: il cognome e il nome dell'utente devono corrispondere ai dati riportati sulla prescrizione, sulle provette e sulla documentazione
informare l'utente sulla prestazione a cui verrà sottoposto	Per rispettare il diritto di informazione e di partecipazione alle cure.
invitarlo ad urinare	Evitare che l'utente urini durante la defecazione (commistione materiale)
fornirgli il vaso per raccogliere le feci	
indossare i guanti	

¹ Università degli Studi di Padova. Corso di Laurea in Infermieristica sede di Montebelluna Precalcino.

A cura di Dott. ssa Nunzia Guadagni, Dott.ssa Sonia Marcante, Dott.ssa Gabriella Munaretto e con la collaborazione di Coordinatore Inf. Mariangela Carollo

con la spatola prelevare dal vaso una piccola quantità di feci	
introdurre il campione nel contenitore	
posizionare l'etichetta sul barattolo	
lavarsi le mani	
documentare la raccolta del campione nella cartella	
consegnare il campione in laboratorio (ev. conservare in frigorifero al massimo per 24 h – per es. parassitologico consegnare prima possibile)	
<i>CAMPIONE PER ACCERTARE LA PRESENZA DI SANGUE OCCULTO NELLE FECI</i>	
<i>Azioni</i>	<i>Motivazioni</i>
Procedura sec. Indicazioni di laboratorio	
<u>Generalmente:</u> <ul style="list-style-type: none"> • L'utente non deve usare lo spazzolino da denti ma praticare frequenti sciacqui con collutorio (evitare sanguinamenti) • Non eseguire l'esame se la paziente è in periodo mestruale (informare il medico) • Accertare alcuni farmaci che determinano irritazione gastrointestinale - es. aspirina- (informare il medico) 	

Bibliografia

- *P.A. Potter, A.G. Perry. Infermieristica generale-clinica. Ed Ildeson - Gnocchi /Sorbona, Napoli 2006*
- *R.F. Craven, C.J. Hirnle. Principi fondamentali dell'assistenza infermieristica. Casa editrice Ambrosiana, 2011*
- *Rehabilitation Nursing Foundation, Practice Guidelines For The Management of Constipation in Adults,2002. Traduzione a cura di Biavati C.*
- *Materiale a cura di: Dott.ssa Guadagni Nunzia, Dott.ssa Sonia Marcante, Dott.ssa Gabriella Munaretto, con la collaborazione di Coordinatore Inf. Carollo Mariangela*